







PESTE SUINA AFRICANA

Ordinanza n° 04/2026
del Commissario Straordinario alla PSA
allegato n° 2



LE PRESCRIZIONI DA SEGUIRE NEL BOSCO
DURANTE LA RICERCA DEI FUNGHI

Introduzione




- **L'ORDINANZA N° 04/2026 FORNISCE INDICAZIONI E PRECISAZIONI PER IL CONTENIMENTO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA;**
- **DI FONDAMENTALE IMPORTANZA È L'ALLEGATO N°2 CHE ELENCA LE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL BOSCO;**
- **UNA PARTE DELL'ALLEGATO È DEDICATA ALLE NORME DI CONDOTTA DA TENERE QUANDO SI FA ALLA RICERCA DI FUNGHI.**






PREMESSA

PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA DI FUNGHI ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE SI DOVRANNO ESSERE ASSICURATE LE NECESSARIE MISURE, VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS DELLA PSA, SIA ATTRAVERSO VETTORI PASSIVI (CANE/I, AUTOVEICOLI E/O STRUMENTI E INDUMENTI), SIA ATTRAVERSO IL DISTURBO DELLA POPOLAZIONE DI SUIDI SELVATICI PRESENTE NELL'AREA. NELLO SPECIFICO, DURANTE LE ATTIVITÀ DI RICERCA,





L'USO DI DISINFETTANTI



**MUNIRSI DI DISINFETTANTI ATTIVI NEI CONFRONTI DEL
VIRUS DELLA PSA COME INDICATO ALLA FINE DELLA
PRESENTAZIONE E ATTREZZATURE IDONEE ALLA
DISINFEZIONE DI MEZZI E STRUMENTAZIONE CHE DOVRÀ
AVERE LUOGO PRIMA DI ADDENTRARSÌ NELLE ZONE DI
RICERCA E PRIMA DI LASCIARLE
(NEBULIZZATORI/DIFFUSORI RISULTANO
INDISPENSABILI).**





LA CURA DELLE SCARPE

**INDOSSARE SOPRASCARPE USA E GETTA
OPPURE CALZATURE FACILI DA PULIRE E
DISINFETTARE PRIMA DI LASCIARE L'AREA
(ALTAMENTE RACCOMANDATO L'USO SPECIFICO
DI CALZATURE DEDICATE).**





COME COMPORTARSI VERSO I SUINI ALLEVATI




**EVITARE CONTATTI DIRETTI O INDIRETTI
CON SUINI ALLEVATI NELLE 48 ORE
SUCCESSIVE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA.**



GESTIONE DEGLI INDUMENTI UTILIZZATI

**RIPORRE EVENTUALI INDUMENTI MONOUSO
UTILIZZATI (TUTE, CALZARI E GUANTI) IN UN
SACCO, CHE A SUA VOLTA DOVRÀ ESSERE
INSERITO UN ALTRO INVOLUCRO, E
PORTARLI VIA PER ESSERE SMALTITI IN UN
CONTENITORE PER RIFIUTI.**






I RIFIUTI




**RISPETTARE IL DIVIETO DI LASCIARE SUL
CAMPO QUALSIASI RESIDUO DI MATERIALE
POTENZIALMENTE INFETTANTE, COMPRESI
QUELLI DI ALIMENTI PORTATI A SEGUITO.**






COME COMPORTARSI CON GLI ANIMALI AL SEGUITO

AVERE CURA, PRIMA DI LASCIARE LA ZONA DI RICERCA, DI PULIRE E DISINFETTARE LE ZAMPE DEL CANE/I PRESENTE/I NELL'ATTIVITÀ, COME INDICATI NELL'ULTIMA IMMAGINE DELLA PRESENTAZIONE.





CONSIGLI PER LA SANIFICAZIONE

Cosa utilizzare per disinfettare scarpe e indumenti?

Per una corretta disinfezione è necessario rimuovere lo sporco grossolano, procedere al lavaggio della superficie con acqua e detergente e, una volta asciutto procedete alla disinfezione rispettando le indicazioni del produttore riguardo quantità, diluizioni e tempo di contatto.



Cambia, lava e disinfetta le scarpe e indumenti

Esempi di alcuni biocidi e PMC da utilizzare contro il virus della Peste Suina Africana

Principio attivo	Uso consigliato
Ammonio poliquaternario V generazione in associazione a glutaraldeide	Superfici, stivali e calzature professionali, automezzi e attrezzature. Disinfezione di volume
Complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensensulfonato + sodio esametafosfato 1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Ortofenilfenolo 1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Idrossido di Sodio 2%	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m3, pH 10,4 -12)
Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
Ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%	Disinfezione di calzature, ruote e attrezzatura usata in attività in ZR 2 e ZR3 per i civili
Dialdeide glutarica+ benzalconio cloruro (1%)	Irrorazione strutture interne ed esterne, ambienti ed attrezzature e mezzi di trasporto
Sali Quaternari d'Ammonio (5%)	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
Idrato di calce 3%	Aspersione pavimenti
Cresolo 6%	Aspersione pavimenti
Cloro attivo 22,8 - 25,2% diluito al 0,5% (5 g/l)	Superfici, stivali e calzature professionali, automezzi e attrezzature. Disinfezione di volume
Ammonio poliquaternario V generazione in associazione a glutaraldeide	Attrezzature in genere, calzature del personale, strutture

Per una corretta disinfezione è necessario rimuovere lo sporco grossolano, procedere al lavaggio della superficie con acqua e detergente e, una volta asciutto procedete alla disinfezione rispettando le indicazioni del produttore riguardo quantità, diluizioni e tempo di contatto. La presente tabella ha scopo puramente illustrativo e non include la totalità dei prodotti disponibili

